

GUARANTEED
TO WORK OR YOUR MONEY BACK*



EXTREME

**LAWN INSECT
KILLER PLUS FUNGUS CONTROL
GRANULES**

Insecticida en gránulos para césped con control de hongos

**DUAL-
ACTION**
FORMULA



**KILLS HARMFUL INSECTS
BY CONTACT**

■ PREVENTS AND KILLS ALL MAJOR LISTED FUNGI
AND THE LAWN DISEASES THEY CAUSE

For outdoor residential use only.

Active Ingredients:	
Propiconazole	0.30%
Lambda-cyhalothrin.....	0.02%
Other Ingredients.....	99.68%
Total.....	100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional
precautionary statements.

*For terms of guarantee, see back panel.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte la parte posterior para conocer las
declaraciones preventivas adicionales.

Net Wt 10 lb (4.53 kg)



EXTREME

**LAWN INSECT
KILLER PLUS FUNGUS CONTROL
GRANULES**

Insecticida en gránulos para césped con control de hongos



Net Wt 10 lb (4.53 kg)

PROTECTS LAWN



KILLS MAJOR LISTED INSECTS



CONTROLS AND KILLS LISTED LAWN FUNGUS



WHAT IT DOES

Prevents and kills Brown patch, Rust, Powdery mildew and other listed fungi and lawn diseases they cause. Kills listed insects on contact.



WHERE TO USE

Outdoors on Lawns.



QUESTIONS OR COMMENTS

Call 1-800-887-3524 or visit our website at www.blackflag.com



GUARANTEE

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Keep children and pets off treated area until product has been watered in and lawn is dry.

In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or a stream that drains directly into a coastal marsh.

THREE EASY STEPS TO USE THIS PRODUCT

Step #1: Determine size of the job, then measure the area to be treated.

Step #2: Use spreader setting chart to determine the appropriate setting for your spreader.

Step #3: Treat as indicated in the rate chart. Thorough coverage is important. Water in granules immediately after application.

NOTE:

- Do not apply more than three times per year per location.
- Do not allow product to run off from target site or apply within 24 hours of rain.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to an area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- Do not make applications during rain. Apply this product only to the lawn area. Water after application. Do not water to the point of runoff.

WHEN TO USE

This product is highly effective when it is used to prevent listed fungi and the lawn diseases they cause. Start treating when grass begins to turn green in the spring or when signs of lawn diseases caused by the listed fungi and insect damage are first noticed. For best control, treat every two weeks.

HOW TO APPLY

Apply Black Flag® Extreme Lawn Insect Killer Plus Fungus Control Granules at a rate of 4 lb/1,000 sq ft over the area to be treated using a properly calibrated drop or rotary-type spreader when conditions are favorable for disease development according to the manufacturer's directions. Check frequently to make sure the spreader is operating properly and distributing product evenly. A more uniform application may be achieved by spreading half of the required amount of product over the area and then applying the remaining half in swaths at a right angle to the first. Avoid skips and excessive overlaps during application. Water lawn after application.

INSECTS CONTROLLED

Ants (Argentine, southern, field, Allegheny mound, honey, pavement, nuisance, crazy), armyworms, blacklegged ticks, crickets, cutworms, earwigs, fleas, Japanese beetles (adults), grasshoppers, billbugs, hyperodes weevils, mole crickets, chinch bugs, lawn moths (sod webworms), leafhoppers, millipedes, Palmetto bugs, sowbugs, mites, spittlebugs and waterbugs.

FUNGI CONTROLLED

Colletotrichum graminicola (Anthracnose), *Rhizoctonia solani* (Brown patch), *Sclerotinia homoeocarpa* (Dollar spot), *Bipolaris spp.* and *Drechslera spp.* (Melting out), *Urocystis agropyri* (Flag smut), *Erysiphe graminis* (Powdery mildew), *Puccinia graminis* (Rust), and *Ustilago striiformis* (Stripe smut).

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store in cool, dry place away from heat or open flame. **Disposal: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

First Aid

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

You may also contact 1-800-887-3524 for emergency medical treatment information.

Environmental Hazards

This pesticide is extremely toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

This pesticide is highly toxic to bees exposed to direct treatment on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds while bees are actively visiting the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Distributed by Chemsico, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-316 EPA Est. Nos. 9198-AL-1(A), 9198-OH-2(B), 9198-OH-1(M), 7401-TX-1(DH), 39578-TX-1(AM)

Circled letter is first letter of lot number. 11-11966 © 2016 UIC

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.

Mantenga los niños y las mascotas fuera de la zona tratada hasta que el producto se haya mojado y el césped esté seco.

En el Estado de Nueva York, no se podrá aplicar este producto en zonas de césped ubicadas a una distancia de hasta 100 pies de un pantano costero o de un arroyo que desemboque directamente en un pantano costero.

TRES PASOS FÁCILES PARA USAR ESTE PRODUCTO

Paso Nº 1: Determine el tamaño del trabajo, luego mida el área que se va a tratar.

Paso Nº 2: Use la tabla de ajuste del difusor para determinar el ajuste adecuado para el suyo.

Paso Nº 3: Efectúe el tratamiento como se indica en la tabla de dosis. Es importante que la cobertura sea completa. Riegue los granulos inmediatamente después de la aplicación.

NOTA:

- No aplique más de tres veces por año por lugar.
- No permita que el producto se escurra del sitio que es el objetivo del tratamiento ni lo aplique hasta que hayan transcurrido 24 horas desde que llovió.
- Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier zona similar a una cuneta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, drenajes pluviales, masas de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.
- No realice aplicaciones durante lluvias. Aplique este producto directamente al césped. Riegue después de la aplicación. No riegue hasta el punto de escurrimiento.

CUÁNDO USAR

Este producto es muy eficaz cuando se usa para prevenir la formación de los hongos señalados y las enfermedades que pueden causar en el césped. Comience el tratamiento cuando el césped empiece a verdearse en la primavera o cuando observe los primeros signos de enfermedad en el césped a causa de los hongos e insectos señalados. Para el mejor control, trate cada dos semanas.

CÓMO APLICAR

Aplique el Insecticida en granulos para césped con control de hongos Black Flag® Extreme sobre el área a tratar, a una dosis de 4 lb/1,000 pies², utilizando un difusor al voleo o giratorio debidamente calibrado, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de enfermedades de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Reviselo con frecuencia para verificar que el difusor esté funcionando correctamente y distribuya el producto de manera uniforme. Logrará una aplicación más uniforme esparciendo sobre el área la mitad de la cantidad de producto necesaria y aplicando después la mitad restante en franjas a un ángulo recto con respecto a la primera. Durante la aplicación, evite dejar áreas sin cubrir o una aplicación excesiva. Riegue el césped después de la aplicación.

INSECTOS CONTROLADOS

Hormigas (Argentina, del sur, de campo, Allegheny mound, de la miel, del pavimento, molestas, locas), gusanos soldados, garrapatas de patas negras, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, escarabajos japoneses (adultos), saltamontes, gorgojos, gorgojos del género Hyperodes, grillos topos, chinches, polilla del césped (oruga tejedora del césped), saltarillas, milpiés, cucarachas de caño, cochinitillas de la humedad, ácaros, cigarrillas y chinches de agua.

HONGOS CONTROLADOS

Colletotrichum graminicola (anthracnosis), *Rhizoctonia solani* (mancha marrón), *Sclerotinia homoeocarpa* (mancha del dólar), *Bipolaris spp.* y *Drechslera spp.* (desintegración), *Urocystis agropyri* (carbón del césped), *Erysiphe graminis* (oidio), *Puccinia graminis* (roya) y *Ustilago striiformis* (carbón foliar).

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego. **Eliminación: Si está vacío:** Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Tirelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese muy bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.

Primeros Auxilios

Si entra en contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

También puede llamar al 1-800-887-3524 para obtener información acerca del tratamiento médico de urgencia.

Riesgos para el medio ambiente

Este pesticida es extremadamente tóxico para los organismos acuáticos, incluyendo los peces y los invertebrados. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipe lluvia en las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada ayudará a evitar el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje.

Este pesticida es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo en los cultivos o las malezas en flor. No aplique este producto ni permita que pase a los cultivos o malezas en flor en caso que haya abejas volando por la zona de tratamiento.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

PROOF OF PURCHASE

FPO
8 91549 11112 4

GUARANTEED
TO WORK OR YOUR MONEY BACK*



EXTREME

LAWN INSECT
KILLER *PLUS* FUNGUS CONTROL
GRANULES

Insecticida en gránulos para césped con control de hongos

Insecticida en gránulos para césped con control de hongos

**DUAL-
ACTION**
FORMULA



KILLS HARMFUL INSECTS BY CONTACT

■ PREVENTS AND KILLS ALL MAJOR LISTED FUNGI
AND THE LAWN DISEASES THEY CAUSE

For outdoor residential use only.

Active Ingredients:

Propiconazole	0.30%
Lambda-cyhalothrin.....	0.02%
Other Ingredients	99.68%
Total.....	100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional
precautionary statements.

*For terms of guarantee, see back panel.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte la parte posterior para conocer las
declaraciones preventivas adicionales.

Net Wt 10 lb (4.53 kg)



EXTREME

LAWN INSECT KILLER *PLUS* FUNGUS CONTROL GRANULES

Insecticida en gránulos para césped con control de hongos



Net Wt 10 lb (4.53 kg)

PROTECTS LAWNS



KILLS MAJOR LISTED INSECTS



CONTROLS AND KILLS LISTED LAWN FUNGUS



WHAT IT DOES

Prevents and kills Brown patch, Rust, Powdery mildew and other listed fungi and lawn diseases they cause. Kills listed insects on contact.



WHERE TO USE

Outdoors on Lawns.



QUESTIONS OR COMMENTS

Call 1-800-887-3524 or visit our website at www.blackflag.com



*GUARANTEE

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.



Keep children and pets off treated area until product has been watered in and lawn is dry.

In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or a stream that drains directly into a coastal marsh.

THREE EASY STEPS TO USE THIS PRODUCT

Step #1: Determine size of the job, then measure the area to be treated.

Step #2: Use spreader setting chart to determine the appropriate setting for your spreader.

Step #3: Treat as indicated in the rate chart. Thorough coverage is important. Water in granules immediately after application.

NOTE:

- Do not apply more than three times per year per location.
- Do not allow product to run off from target site or apply within 24 hours of rain.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to an area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- Do not make applications during rain. Apply this product only to the lawn area. Water after application. Do not water to the point of runoff.

WHEN TO USE

This product is highly effective when it is used to prevent listed fungi and the lawn diseases they cause. Start treating when grass begins to turn green in the spring or when signs of lawn diseases caused by the listed fungi and insect damage are first noticed. For best control, treat every two weeks.

HOW TO APPLY

Apply Black Flag® Extreme Lawn Insect Killer Plus Fungus Control Granules at a rate of 4 lb/1,000 sq ft over the area to be treated using a properly calibrated drop or rotary-type spreader when conditions are favorable for disease development according to the manufacturer's directions. Check frequently to make sure the spreader is operating properly and distributing product evenly. A more uniform application may be achieved by spreading half of the required amount of product over the area and then applying the remaining half in swaths at a right angle to the first. Avoid skips and excessive overlaps during application. Water lawn after application.

INSECTS CONTROLLED

Ants (Argentine, southern, field, Allegheny mound, honey, pavement, nuisance, crazy), armyworms, blacklegged ticks, crickets, cutworms, earwigs, fleas, Japanese beetles (adults), grasshoppers, billbugs, hyperodes weevils, mole crickets, chinch bugs, lawn moths (sod webworms), leafhoppers, millipedes, Palmetto bugs, sowbugs, mites, spittlebugs and waterbugs.

FUNGI CONTROLLED

Colletotrichum graminicola (Anthracnose), *Rhizoctonia solani* (Brown patch), *Sclerotinia homoeocarpa* (Dollar spot), *Bipolaris spp.* and *Drechslera spp.* (Melting out), *Urocystis agropyri* (Flag smut), *Erysiphe graminis* (Powdery mildew), *Puccinia graminis* (Rust), and *Ustilago striiformis* (Stripe smut).

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.



Mantenga los niños y las mascotas fuera de la zona tratada hasta que el producto se haya mojado y el césped esté seco.

En el Estado de Nueva York, no se podrá aplicar este producto en zonas de césped ubicadas a una distancia de hasta 100 pies de un pantano costero o de un arroyo que desemboque directamente en un pantano costero.

TRES PASOS FÁCILES PARA USAR ESTE PRODUCTO

Paso Nº 1: Determine el tamaño del trabajo, luego mida el área que se va a tratar.

Paso Nº 2: Use la tabla de ajuste del difusor para determinar el ajuste adecuado para el suyo.

Paso Nº 3: Efectúe el tratamiento como se indica en la tabla de dosis. Es importante que la cobertura sea completa. Riegue los gránulos inmediatamente después de la aplicación.

NOTA:

- No aplique más de tres veces por año por lugar.
- No permita que el producto se escurra del sitio que es el objetivo del tratamiento ni lo aplique hasta que hayan transcurrido 24 horas desde que llovió.
- Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier zona similar a una cuneta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, drenajes pluviales, masas de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.
- No realice aplicaciones durante lluvias. Aplique este producto directamente al césped. Riegue después de la aplicación. No riegue hasta el punto de escurrimiento.

CUÁNDO USAR

Este producto es muy eficaz cuando se usa para prevenir la formación de los hongos señalados y las enfermedades que pueden causar en el césped. Comience el tratamiento cuando el césped empiece a verdearse en la primavera o cuando observe los primeros signos de enfermedad en el césped a causa de los hongos e insectos señalados. Para el mejor control, trate cada dos semanas.

CÓMO APLICAR

Aplique el Insecticida en gránulos para césped con control de hongos Black Flag® Extreme sobre el área a tratar, a una dosis de 4 lb/1,000 pies², utilizando un difusor al voleo o giratorio debidamente calibrado, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de enfermedades de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Reviselo con frecuencia para verificar que el difusor esté funcionando correctamente y distribuya el producto de manera uniforme. Logrará una aplicación más uniforme esparciendo sobre el área la mitad de la cantidad de producto necesaria y aplicando después la mitad restante en franjas a un ángulo recto con respecto a la primera. Durante la aplicación, evite dejar áreas sin cubrir o una aplicación excesiva. Riegue el césped después de la aplicación.

INSECTOS CONTROLADOS

Hormigas (Argentina, del sur, de campo, Allegheny mound, de la miel, del pavimento, molestas, locas), gusanos soldados, garrapatas de patas negras, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, escarabajos japoneses (adultos), saltamontes, gorgojos, gorgojos del género Hyperodes, grillos topos, chinches, polilla del césped (oruga tejedora del césped), saltarillas, milpiés, cucarachas de caño, cochinillas de la humedad, ácaros, cigarrillas y chinches de agua.

HONGOS CONTROLADOS

Colletotrichum graminicola (antracnosis), *Rhizoctonia solani* (mancha marrón), *Sclerotinia homoeocarpa* (mancha del dólar), *Bipolaris spp.* y *Drechslera spp.* (desintegración), *Urocystis agropyri* (carbón del césped), *Erysiphe graminis* (oidio), *Puccinia graminis* (roya) y *Ustilago striiformis* (carbón foliar).

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store in cool, dry place away from heat or open flame. **Disposal: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

First Aid

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

You may also contact 1-800-887-3524 for emergency medical treatment information.

Environmental Hazards

This pesticide is extremely toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

This pesticide is highly toxic to bees exposed to direct treatment on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds while bees are actively visiting the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Distributed by Chemsico, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-316 EPA Est. Nos. 9198-AL-1(A), 9198-OH-2(B), 9198-OH-1(M), 7401-TX-1(DH), 39578-TX-1(AM)

Circled letter is first letter of lot number. 11-11966 © 2016 UIC

Spreader Settings for Overall Lawn Application Ajustes del difusor para la aplicación general en césped

Spreader Make and Model Marca y modelo del difusor	4 lb/1,000 sq ft 4 lb/1,000 pies ²
REPUBLIC	
EZ Drop Spreader	3.5
EZ Broadcast Spreader	4
SCOTTS	
AccuGreen Drop Spreader	3.5
Turf Builder Classic Drop Spreader	4
SpeedyGreen Broadcast Spreader	4
Turf Builder EdgeGuard DLX Broadcast Spreader	4
Turf Builder EdgeGuard Mini Broadcast Spreader	4
Pro EdgeGuard Broadcast Spreader	4
Deluxe EdgeGuard Broadcast Spreader	3.5
EARTHWAY	
Drop Spreader	3
EV-N-SPRED Broadcast Spreader	3.5
PRECISION	
Rotary Broadcast Spreader	3.5
STA-GREEN	
Broadcast Spreader	4.5

Note: The spreader settings listed above are approximate. Accurately weigh a few pounds into your spreader and apply to a measured area. Then adjust spreader setting if necessary, in order to ensure correct rate of application.

Nota: Los ajustes del difusor indicados son aproximados. Pese con exactitud algunas libras en su difusor y aplique a un área medida. Luego, si es necesario, ajuste el difusor, para asegurar la dosis de aplicación correcta.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego. **Eliminación: Si está vacío:** Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Térelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese muy bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.

Primeros Auxilios

Si entra en contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

También puede llamar al 1-800-887-3524 para obtener información acerca del tratamiento médico de urgencia.

Riesgos para el medio ambiente

Este pesticida es extremadamente tóxico para los organismos acuáticos, incluyendo los peces y los invertebrados. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipe lluvia en las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada ayudará a evitar el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje.

Este pesticida es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo en los cultivos o las malezas en flor. No aplique este producto ni permita que pase a los cultivos o malezas en flor en caso que haya abejas volando por la zona de tratamiento.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

PROOF OF PURCHASE

FPO
8 91549 11112 4