1000 030 953

Vigoro®

SOUTHERN WEED & FEED



ASSURANCE
PARTICLE TECHNOLOGY®

- greens in 72 hours
- even feeding, even greening, with no burn guaranteed

kills dollarweed & over 35 other weed types, as listed

use on St. Augustinegrass (including Floratam), Zoysiagrass, Centipede and Carpetgrass lawns only



29-0-3

APPLY ANYTIME WEEDS ARE ACTIVELY GROWING
WATER IN AFTER APPLICATION

ACTIVE INGREDIENT:

Atrazine	1.380%
Related Compounds	0.028%
OTHER INGREDIENTS:	98.592%
TOTAL	100.000%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back for additional Precautionary Statements.

WORKS THE FIRST TIME
OR YOUR MONEY BACK

FEEDS
5,000 SQ FT / 464.51 M²

NET WT 16 LBS / 7.25 kg

1000 030 953

WHY FERTILIZE THE LAWN?

While it is easy to see that satisfying deep green when you fertilize, regular feedings can actually do much more...

1. **Promote a deep and dense root system that is better able to reach water and find nutrients during tough heat & drought, so lawn stays greener longer and bounces back faster.**
2. **Thicken lawn with additional blades of grass, making it more resistant to bare spots and thinning.**
3. **Help prevent weeds by making it difficult for weed seeds in the air to find soil to root, as well as crowd out existing weeds.**



UNFED LAWN
Césped sin fertilizar

VS.



REGULARLY FED LAWN
Césped con fertilización frecuente

¿POR QUÉ FERTILIZAR EL CÉSPED?

Si bien es fácil ver ese satifactorio verde intenso cuando se fertiliza, las fertilizaciones regulares pueden hacer mucho más...

1. **Fomenta un sistema de raíces denso y profundo que es más apto para encontrar agua y nutrientes durante las temporadas de calor y sequía, por lo que el césped se mantiene más verde por más tiempo, y se recupera con más rapidez.**
2. **Tupe el pasto con brizna de césped adicionales, protegiéndolo contra las áreas descubiertas y poco tupidas.**
3. **Ayuda a prevenir las malezas al dificultar que sus semillas esparcidas por el aire encuentren tierra disponible para echar raíces, así como a desplazar las malezas existentes.**

NEXT FEEDING/SIGUIENTE FERTILIZACIÓN

Feed every 8 weeks for optimal results.

Fertilice cada 8 semanas para obtener resultados óptimos.



Apply anytime weeds are actively growing.†
†Maximum of 2 applications per year.

Aplique siempre que haya un crecimiento activo de malezas.†
†Máximo 2 aplicaciones al año.

OR



Apply anytime during the growing season.

Aplique en cualquier momento durante la temporada de crecimiento.

DIRECTIONS FOR USE


It is a violation of Federallaw to use this product in a manner inconsistent with its labelling.

Where To Use:
- Use on St. Augustinegrass (including 'Floratam'), zoysiagrass, centipede and carpetgrass lawns ONLY. Do not use on bluegrass, fescue, bentgrass, bahiagrass, ryegrass, bermudagrass or dichondra lawns

Application Restrictions:
- DO NOT APPLY THIS PRODUCT IN A WAY THAT WILL CONTACT ANY PERSON OR PET, EITHER DIRECTLY OR THROUGH DRIFT
- KEEP PEOPLE AND PETS OUT OF AREA DURING APPLICATION
- DO NOT ENTER OR ALLOW OTHERS (INCLUDING CHILDREN AND PETS) TO ENTER THE TREATMENT AREAS (EXCEPT THOSE INVOLVED IN THE WATERING) UNTIL WATERING IN IS COMPLETE AND THE SURFACE IS DRY
- This product must be WATERED IN IMMEDIATELY after application
- Do not apply by hand or handheld device such as handheld rotary applicator
- Do not apply more than 3.2 lbs of product per 1,000 sq ft (139 lbs of product per acre), which is equivalent to 2 lbs of active ingredient per acre, per application
- Do not make more than two applications per year
- Not for use on turf being grown for sale or other commercial use as sod, or for commercial seed production, or for research purposes
- Not for use on or under trees, shrubs, ornamental trees, bedding plants, flowers or garden plants. Do not apply under the branches (root zone area) of shrubs, trees, flowers, etc
- Do not apply to newly seeded zoysiagrass, centipedegrass or carpetgrass lawns. Wait until they have required at least two mowings
- Not for use in the states of Hawaii or Alaska, or in the U.S. territories (Puerto Rico, Guam, American Samoa, the U.S. Virgin Islands, and the North Mariana Islands)

When To Apply:
- For postemergence control, apply anytime broadleaf weeds are actively growing. If complete control is not obtained, a second application may be necessary two months after the first
- Apply in the fall to control henbit, chickweed, annual bluegrass (Poa), cudweed, parsley-piert, rescuegrass and other listed winter weeds
- Apply to newly sprigged St. Augustine and zoysiagrass lawns to help prevent competition from newly emerging weeds
- Water the new sprigs, allow the grass blades to dry, then make the application of Vigoro® Southern Weed & Feed
- Do not apply to centipede or carpetgrass lawns during the period of winter dormancy — approximately October 15 to March 15 (okay to apply in Florida, however). Do not apply to newly seeded centipede or carpetgrass lawns until after the new grass has been mowed at least twice

How To Apply:
1. Determine size of area to be treated — measure length and width in feet, then multiply to determine coverage area in square feet (length x width). **Next, subtract non-lawn areas.**
2. Use the spreader setting chart to determine the appropriate setting.
3. Apply evenly over dry grass, avoiding streaking, skips and overlaps — thorough coverage is important. On hot days (above 80 °F), water the lawn to rinse particles off the grass.



INSTRUCCIONES DE USO


Usar este producto de una manera distinta a la indicada en la etiqueta vulnera la legislación federal.

Dónde utilizar el producto:
- Usar SÓLO en céspedes San Agustín (incluso de la variedad 'floratam'), zoysia, ciempiés y pasto de alfombra. No usar en céspedes de pasto azul, festuca, agróstide, pasto de bahía, raigrás, bermuda o dichondra

Restricciones para la aplicación del producto:
- NO APLIQUE ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA QUE ENTRE EN CONTACTO CON PERSONAS O MASCOTAS, YA SEA DE MANERA DIRECTA O AL SER ARRASTRADO POR EL VIENTO
- MANTENGA ALEJADAS DEL ÁREA A PERSONAS Y MASCOTAS DURANTE LA APLICACIÓN
- NO ENTRE NI PERMITA EL ACCESO DE OTROS (INCLUYENDO NIÑOS Y MASCOTAS) A LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO (EXCEPTO DE LOS ENCARGADOS DEL RIEGO) HASTA QUE SE HAYA COMPLETADO EL RIEGO Y LA SUPERFICIE ESTÉ SECA
- Este producto debe REGARSE INMEDIATAMENTE después de su aplicación
- No lo aplique manualmente ni con dispositivos manuales tales como un aplicador giratorio
- No aplique más de 3,2 libras de producto por cada 1,000 pies cuadrados (139 libras por acre), que equivalen a 2 libras del ingrediente activo por acre, por aplicación
- No realice más de dos aplicaciones al año
- No lo utilice en césped cultivado para su venta u otros usos comerciales, como tepes, ni para la producción de semilla comercial o con fines de investigación
- No lo utilice en árboles, ya sean normales u ornamentales; arbustos; plantas de macizo o de jardín; flores, ni debajo de ellos. No lo aplique debajo de las ramas o tallos (la zona de las raíces) de arbustos, árboles, flores, etc
- No aplicar en céspedes recién sembrados de zoysia, ciempiés o pasto de alfombra. Esperar hasta que hayan requerido al menos dos cortes de césped
- No apto para uso en los estados de Hawaii o Alaska, ni en los territorios de los EE. UU. (Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de los EE. UU. y las Islas Marianas del Norte)

Cuándo aplicar el producto:
- Para un control posterior a la germinación, aplíquelo siempre que haya un crecimiento activo de malezas de hoja ancha. Si no logra controlarlas por completo, puede que sea necesaria una segunda aplicación dos meses después de la primera
- Aplíquelo en el otoño para controlar la ortiga mansa, la álsine, el pastito de invierno (espiguilla o poa), la siempreviva, el pie de león, la cebadilla y otras malezas invernales enumeradas
- Aplicar a los céspedes recién retoñados San Agustín y Zoysia para ayudar a prevenir contra la competencia de las malezas recién emergentes
- Riegue los nuevos retoños, deje secar la brizna del césped, y luego aplique el herbicida y fertilizante para céspedes meridionales de Vigoro®
- No lo aplique en céspedes ciempiés o alfombra durante el periodo de latencia invernal; aproximadamente entre el 15 de octubre y el 15 de marzo (aunque sí puede aplicarse en Florida). No lo aplique a los céspedes ciempiés o alfombra recién sembrados sino hasta que haya cortado el césped nuevo por lo menos dos veces

Cómo aplicar el producto:
1. Determine el tamaño del área a tratar; mida el largo y el ancho en pies, y luego multiplíquelos para determinar el área de cobertura en pies cuadrados (largo x ancho). **A continuación, reste las áreas sin césped.**
2. Consulte la tabla de posiciones del esparcidor para determinar la posición adecuada.
3. Aplica uniformemente sobre el césped seco, evitando vetas, saltos y superposiciones; es importante una cobertura completa. En días calurosos (más de 80 °F), riegue el césped para quitar las partículas del césped.



WHAT IT DOES

CONTROLS WEEDS
- **Vigoro® Southern Weed & Feed contains an active ingredient that works fast and kills unsightly and harmful weeds.**
- **Also prevents germination of many common spring- and fall-germinating annual weeds. It will provide postemergence control of many winter and summer weeds.**

FERTILIZES AND REPLENISHES
- **Dual feeding formula provides both quick greening and extended feeding, resulting in a thicker, stronger, greener lawn.**

This product controls the following list of growing weeds:
Annual Bluegrass (Poa Annua), Annual Sowthistle, Black Medic, Blue Toadflax, Buckhorn Plantain, Burclover, Carolina Geranium, Carpetweed, Chamber-bitter (niruri), Chickweed, Common, Chickweed, Mouseear, Clover, Common Dandelion, Corn Speedwell, Cudweed, Cutleaf Eveningprimrose, Dichondra, Dollarweed, Florida Betony , Florida Pusley, Fragrant Cudweed (Rabbit Tobacco), Henbit, Knotweed, Lambsquarters, Lespedeza, Lippia (Matchweed), Narrowleaf Vetch, Oxalis (Woodsorrel), Parsley-Piert, Pepperweed, Pigweed, Purslane, Ragweed, Red Sorrel, Rescuegrass, Shepherd's-purse, Spotted Spurge, Spurweed (Lawn Burweed), Stinging Nettle, Venus Lookingglass, Wild Mustard.

QUÉ ES LO QUE HACE EL PRODUCTO

CONTROLA LA MALEZA
- **Vigoro® Southern Weed & Feed contiene un ingrediente activo que actúa rápidamente y elimina malezas dañinas y desagradables.**
- **También previene la germinación de muchas malezas anuales que nacen en la primavera y en el otoño. Y ofrece un control de muchas malezas invernales y veraniegas luego de su germinación.**

FERTILIZA Y REPONE
- **Su fórmula de doble fertilización proporciona tanto un reverdecimiento rápido como una fertilización prolongada, lo cual resulta en un césped más tupido, más fuerte y más verde.**

Este producto controla las siguientes malezas en crecimiento:
Ambrosia, anicillo, berro de jardín, bledo, bolsa del pastor, carretilla, cebadilla, cenizo, chanca piedra, chicalotillo anual, dicondra, diente de león, espejo de Venus, estalaria/oreja de ratón, estalaria común, geranio silvestre, hidrocótila, hierba de pollo (codillo prieto), lantén de hoja angosta, lespedeza, linaria, lippia (cerillo), lupina, mostaza silvestre, oca o vinagrillo (agritos), ortiga, ortiga mansa, pastito de invierno (espiguilla o poa), pie de león, poligono, prímula nocturna, roselle, siempreviva, siempreviva olorosa, tártago moteado, tilia floridana, trébol, verdolaga, verdolaga del caballo, verónica del maiz, veza de hoja angosta.

SPREADERS AND CALIBRATIONS

Typically, a lawn will utilize 1 to 4 lb of nitrogen per 1,000 sq ft per growing season. When used as directed, this product will supplement your regular fertilizer program by providing 0.928 lb of nitrogen per 1,000 sq ft. Consult your local County Extension office for questions regarding a fertilizer program suitable for your geographic region.

Calibrate your spreader with each application. Adjust to apply at the rate of 3.2 lbs of product per 1,000 sq ft (2 lb active ingredient per acre). This 16 lb bag covers 5,000 sq ft of lawn area. Do not make more than two applications per year.

NOTE: The spreader settings listed at right are approximate. It is important to check calibration of spreader frequently to ensure spreader is functioning properly and applying product evenly. To check calibration, accurately weigh a few pounds into your spreader and apply to a measured area. Then adjust spreader setting if necessary in order to ensure correct rate of application.

SPREADER SETTINGS
POSICIONES DEL ESPARCIDOR

This package applies 3.2 LB of product per 1,000 SQ FT.
Este paquete aplica 3.2 LB de producto por 92.9 metros cuadrados.

BROADCAST/ ROTARY SPREADERS ESPARCIDORES POR VOLEO/ GIRATORIOS	
VIGORO® BROADCAST/ROTARY SPREADERS: VIGORO 4300, VIGORO 10,000, VIGORO 15,000	4
VIGORO SPREAD CONTROL™	5
SCOTTS® BROADCAST/ROTARY SPREADERS: SCOTTS® TURF BUILDER® EDGEGUARD® DLX or MINI	4¾
DROP SPREADERS ESPARCIDORES POR GRAVEDAD	
SCOTTS® DROP SPREADER: SCOTTS® TURF BUILDER® CLASSIC DROP	10



ESPARCIDORES Y CALIBRACIONES

Por lo general, para el césped se utilizarán de 1 a 4 libras de nitrógeno por cada 1,000 pies cuadrados, por temporada de crecimiento. Al usarse como se indica, este producto complementará su programa de fertilización normal, proporcionando 0.928 libras de nitrógeno por cada 1,000 pies cuadrados. Consulte con la oficina de Extensión de su condado local las preguntas relacionadas con un programa de fertilización adecuado para su región geográfica.

Calibre el esparcidor para cada aplicación. Ajústelo para aplicar en una proporción de 3.2 libras de producto por cada 1,000 pies cuadrados (2 libras del ingrediente activo por acre). Esta bolsa de 16 libras cubre 5,000 pies cuadrados de área de césped. No realice más de dos aplicaciones por año.

IMPORTANTE: Las posiciones del esparcidor que se indican a la derecha son aproximadas. Es importante verificar la calibración del esparcidor con frecuencia para asegurarse de que funcione como es debido y de que aplique el producto de manera uniforme. Para verificar la calibración, coloque con precisión algunas libras del producto en su esparcidor y aplíquelas en un área de una medida determinada. Luego ajuste la posición del esparcidor, de ser necesario, para asegurar la proporción correcta de la aplicación.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing.
PESTICIDE AND CONTAINER DISPOSAL: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available.
If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans & Domestic Animals

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse. Do not apply granular lawn products by hand. Avoid contact with hands and skin. Broadcast applications must NOT be made using handheld devices, such as a belly grinder or handheld rotary applicator. Such equipment may only be used for spot treatments.

First Aid

If in eyes:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
Note: Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.	

Environmental Hazards:
Atrazine can travel (seep or leach) through soil and enter groundwater, which may be used as drinking water. Atrazine has been found in groundwater. Users are advised not to apply Atrazine to well-drained soils where the water table (groundwater) is close to the surface and where these soils are very permeable. Your local agricultural agencies can provide further information on the type of soil in your area and the location of groundwater. This product is toxic to aquatic invertebrates. Runoff and drift from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.
NON-TARGET ORGANISM ADVISORY:
This product is toxic to plants and may adversely impact the forage and habitat of non-target organisms, including pollinators, in areas adjacent to the treated site. Protect the forage and habitat of non-target organisms by following label directions intended to minimize drift.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Vigoro® Southern Weed & Feed 29-0-3 F1305

GUARANTEED ANALYSIS:

Total Nitrogen (N)*	29%
21.2% Urea Nitrogen	
7.2% Other Water Soluble Nitrogen	
0.6% Water Insoluble Nitrogen	
Soluble Potash (K_2O)	3%

Derived from: Methylene Ureas, Urea, Polymer Coated Sulfur Coated Urea and Potassium Chloride

*Contains 7.3% slowly available Nitrogen from Methylene Ureas and Polymer Coated Sulfur Coated Urea.

VIGORO® GUARANTEE:
If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a refund check promptly.
Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at **https://www.aapfco.org/metals.html**

EPA Reg. No. 73327-3
EPA Est. No. 9198-OH-1M, 9198-OH-2D, 538-OH-1S, 538-OH-2V, 084175-TX-1R, 82757-FL-1T, 82757-OH-1R, 82757-MA-2R, 66676-OR-1J, 85653-OH-1R, 9198-AL-1L
Superscript used is first letter of run code on end of container.

Sold and Guaranteed by: Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250, Las Vegas, NV 89169-6754
©2023. World rights reserved.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guárdelo en un lugar limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta doblando la parte superior y asegurándola.
ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA DEL ENVASE: El envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni a llenar este envase.
Si está vacío: Tírelo a la basura o dispóngalo si se recicla, de ser posible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para recibir instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca tire el producto sobrante en drenajes internos ni externos.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el baño. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. No aplique los productos granulados para césped con la mano. Evite el contacto con las manos y la piel. Las aplicaciones por voleo no deben hacerse con dispositivos manuales, tales como trituradora de cintura o un aplicador giratorio manual. Dichos equipos sólo pueden utilizarse para tratamientos localizados.

Primeros auxilios

Si entra en los ojos:	• Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lentamente y con cuidado con agua 15 a 20 minutos. • Retire los lentes de contacto, de haberlos, después de trascurridos los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo. • Llame a un centro de toxicología o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
Importante: Tenga el envase del producto o la etiqueta consigo cuando llame al centro de toxicología o al médico, o al acudir a recibir tratamiento.	

Riesgos ambientales:
La atrazina puede desplazarse (filtrarse o lixiviarse) por el suelo y penetrar el agua del subsuelo, la cual podría utilizarse como agua para beber. Se ha encontrado atrazina en el agua del subsuelo. Se advierte a los usuarios no aplicar atrazina en suelos bien drenados, donde el manto freático (el agua del subsuelo) está cerca de la superficie y la tierra es muy permeable. Sus organismos agrícolas locales pueden proporcionarle más información sobre la clase de suelo de su zona y la ubicación del agua subterránea. Este producto es tóxico para los invertebrados acuáticos. Los escurrimientos o la dispersión desde las áreas tratadas pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos del las zonas aledañas. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida penetre o se escurra en drenajes pluviales, zanjas de desagüe, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas, ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Barrer el producto que caiga sobre entradas de automóviles, aceras o la calle de regreso al área de césped tratada ayudará a evitar que se escurra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.
ADVERTENCIA SOBRE ORGANISMOS QUE NO SEAN EL OBJETIVO: Este producto es tóxico para las plantas y puede tener un impacto adverso en el forraje y el hábitat de organismos que no sean el objetivo, incluidos los polinizadores, en áreas adyacentes al sitio tratado. Protege el forraje y el hábitat de los organismos que no son el objetivo siguiendo las instrucciones de la etiqueta con el fin de reducir al mínimo la desviación.
AVISO: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso no acorde con las instrucciones.

LA GARANTÍA VIGORO®:
Si por alguna razon usted, el cliente, no estuviera satisfecho despues de haber usado este producto, tiene derecho a que se le devuelva su dinero. Sólo envíenos el comprobante de compra y le enviaremos un reembolso por correo de inmediato.



Visit Us On The Internet
or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visítenos en Internet
o llame a nuestra línea directa de satisfacción al cliente

vigoro.com or 1-800-394-1870

22538A3
VID-AM BG10132
Proof of Purchase

FPO

0 71645 22538 7

Vigoro® Southern Weed & Feed 5M