

KILLS BY CONTACT

TREATS UP TO 16,500 SQ. FT.

ORTHO®

BUG B-gon™

**LAWN
INSECT KILLER**

KILLS ABOVE & BELOW THE GROUND

KILLS ALL LISTED INSECTS

6 MONTH CONTROL*



ANTS



FLEAS



GRUBS



TICKS



SPIDERS

*Ants (except pharaoh, carpenter and harvester ants)

FOR RESIDENTIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional
precautionary statements.

NET WT. 10 LBS / 4.54kg

ACTIVE INGREDIENT: 0.20%
Bifenthrin†
OTHER INGREDIENTS: 99.80%
TOTAL 100.00%

† Cis isomers 97% minimum, trans isomers
3% maximum.

May contain peanut by-products

ORTHO®

**BUG
B-gon™**
LAWN INSECT KILLER

KILLS ALL LISTED INSECTS



ANTS



FLEAS



GRUBS



TICKS



SPIDERS

6 MONTH CONTROL*

*Ants (except pharaoh, carpenter and harvester ants)

RD 485
GR S 2293
SP 3149
GR 7728

ORTHO® BUG B-gon™



IF WATERING IN, ALLOW AREA TO DRY BEFORE RE-ENTERING

ORTHO® & YOUR ENVIRONMENT

Your yard is a place for family and pets to enjoy. That's why Ortho® products are designed with care to provide effective solutions to insect problems. Please follow instructions for appropriate usage, storage and disposal.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

USE RESTRICTIONS:

- Apply this product directly to the lawn or garden area. Water treated area as directed on this label. Do not water to the point of run-off. Do not make applications during rain.
- Do not apply to hard surfaces such as sidewalks, driveways, and streets where the product is likely to wash off into sewers and waterways.
- Do not allow people and pets to re-enter treated areas until granules have been watered in and area has dried.
- In New York State, this product may NOT be applied to any grass or turf area (lawns) within 100 feet of a water body (lake, pond, stream, wetland, or drainage ditch). In New York State, do not make a single repeat application of this product if there are signs of renewed insect activity, but not sooner than two weeks after the first application.

- Apply early in the spring to prevent infestation.
- Otherwise, apply when insect activity or damage is first observed in the lawn (lawn thins and turns brown or moths fly from the grass when you mow). Do not treat just the browned area of lawn. To prevent further damage, treat entire lawn.

PRODUCT FACTS

INSECTS KILLED/CONTROLLED FOR 6 MONTHS

Use Ortho® Bug B-gon™ Lawn Insect Killer to kill and provide 6 month residual control of:

- Ants Acrobat, Allegheny Mound Argentine, Big Headed, Black Turf, Citronella, Cornfield, Crazy, Fire, Ghost, Lasius spp., Little Black, Odorous, Pavement, Pyramid, Small Honey, Sugar, Thief, White-Footed

INSECTS KILLED/CONTROLLED FOR 3 MONTHS

Use Ortho® Bug B-gon™ Lawn Insect Killer to kill and provide 3 month residual control of:

- Ants Red Harvester
- Armyworms Fall, Lawn
- Beetles Billbugs (Bluegrass & Hunting), Black Turfgrass, Ateneus, Dichondra Flea, Ground, Lady Beetles (Asian, Convergent, Seven-Spotted, Thirteen-Spotted & Twice-Stubbed), Weevils (Annual Bluegrass)
- Bristletails
- Caterpillars Turfgrasses (Black, Bronzed, Granulate, & Variegated), Flies Skipper, Striped Grassworm, Webworms (Sod & Tropical Sod)
- Chinch Bugs
- Crickets Arizona, Common Short Tailed, Eastern Striped, Fall Field, House, Indes Short Tailed, Northern Wood, Sand Field, Southeast Field, Southern Wood, Spring Field, Texas Field, Tropical Variable Field, Vocal Field, Western Striped
- Earwigs
- Firebrats
- Flies European Crane (larvae), Fruit
- Grasshoppers
- Greenbug
- Leafhoppers
- Mealybugs
- Millipedes
- Mole Crickets Southern, Tawny
- Moths Lucerne
- Pillbugs
- Scorpions Arizona Stripetail, California Common, Eastern Sand, Lesser Stripetail, Northern, Southern Unstriped, Yellow Ground
- Seed Maggots
- Sowbugs
- Spiders Burrowing Wolf, Longbodied Cellar, Marbled Cellar, Pirate Wolf, Shortbodied Cellar, Thinklegged Wolf
- Spittle Bugs Two Lined
- Ticks American Dog, Brown Dog, Deer***
- Wireworms

INSECTS KILLED/CONTROLLED

Ortho® Bug B-gon™ Lawn Insect Killer, Also Kills:

- Beetles Asiatic Garden, European Chafers, Green June, Masked Chafers, May/June, Oriental, Sugarcan
- Caterpillars Bagworms
- Centipedes
- Fleas Cat
- Flies European Crane (adult), Fruit
- Fungus Gnat Adults and Larvae
- Grubs***
- Leaf-footed bugs
- Leafrollers Omnivorous
- Mites
- Mole Crickets European, Northern, Prairie, Short-Winged
- Plant Bugs
- Scale
- Scorpions Dune ***in vegetable gardens
- Springtails
- Treeshoppers
- Webworms Grass
- Weevils Black Vine (larvae), Root (larvae)

For lawn grub control, apply Scotts® GrubEx®, Season-Long Grub Killer anytime from early April to August

WHERE TO APPLY	Lawns	Ornamental and Flower Gardens (Perimeter Treatment)
WHEN TO APPLY	Apply early in the Spring or Summer to prevent infestation. Otherwise, apply at the first sign of insect activity or damage.	
HOW TO APPLY	For best results, treated area should be thoroughly watered immediately after application.	
On Lawns	<ul style="list-style-type: none"> Using a spreader designed for application of granular materials, uniformly apply 0.6 to 1.2 lbs. over 1000 sq. ft. Leave a one-foot wide untreated strip of lawn next to hard surfaces (such as sidewalks and driveways) and sewer drains to prevent potential run-off into sewers and waterways. For season long, 3 & 6 month control, apply 2.3 lbs. of product for every 1000 sq. ft./0.6 lbs. of product for every 250 sq. ft. A 10 pound bag will treat up to 16,500 sq. ft. of lawn. 	
On Ornamentals & Flowers	<ul style="list-style-type: none"> Apply 0.3 to 0.6 lbs. of product evenly over each 500 sq. ft. area. Repeat if there are signs of renewed insect activity. Product can be applied just before planting or after plants emerge. 	
Vegetable Gardens	<ul style="list-style-type: none"> A single application may be applied just prior to planting or after plants emerge and worked into the top 4 to 6 inches of soil. Use 0.6 lbs. of product for a 500 sq. ft. area. 	
Home Foundation	<ul style="list-style-type: none"> Evenly apply a 2 foot wide band next to the home foundation. Use 0.3 to 0.6 lbs. of product for each 500 sq. ft. (2 ft. x 250 ft.). For 3 & 6 month control, apply 1.2 lbs. of product for every 500 sq. ft./0.6 lbs. of product for every 250 sq. ft. Re-apply after 3 months if necessary. 	

PEOPLE AND PETS: Do not allow people and pets to re-enter treated areas until granules have been watered in and area has dried.



Ortho® Bug B-gon™ Lawn Insect Killer can be applied to the vegetables listed below

CROP	DAYS TO WAIT TO HARVEST
Tomatoes, sweet corn	1
Green peas, sugar snap peas, snow peas, green beans (wax beans, snap beans), dry beans (black-eyed peas, cow pea), cucumber, gourds, muskmelon, pumpkin, squash, and watermelon	3
Broccoli, Chinese broccoli, cabbage, cauliflower, kohlrabi, mustard greens, eggplant, head lettuce, peppers (bell and non-bell)	7

SPREADER TIPS For best results, use a Scotts® spreader

SPREADER SETTINGS
Pounds of product / 1,000 sq ft
0.6 lb • 1.2 lbs • 2.3 lbs

Scotts® Drop Spreader 6 • 8 • 9 3/4

Directions: Mow lawn first if grass is tall enough to touch the bottom of the spreader. First apply two header strips. Operate spreader the longest way of the lawn. Overlap wheel marks to ensure uniform coverage. Shut off spreader when you have reached the header strips or stopped.

Scotts® EdgeGuard® Rotary 2 1/4 • 3 1/4 • 4 1/2
Directions: Shut off spreader anytime you stop. For complete coverage, make each pass about 5 feet from the wheel track so that some overlapping occurs. For even application, walk at a steady pace slightly overlapping each pass.

Elite Spreader 3 3/4 • 4 1/4 • 4 3/4

Directions: Make perimeter pass with EdgeGuard® on to protect areas not to be treated. Make parallel internal passes 6 ft. apart to ensure even coverage. Release the trigger when making turns or when you stop.

When using other spreaders, calibrate the spreader settings based on the manufacturer's recommendations.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if swallowed. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

User Safety Recommendations: User should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. User should remove clothing/personal protective equipment (PPE) immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutter or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

FIRST AID

If swallowed: • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
• Have person sip a glass of water if able to swallow.
• Do not induce vomiting unless told to by the poison control center or doctor.
• Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If in eyes: • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
• Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
• Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If on skin or clothing: • Take off contaminated clothing.
• Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
• Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOTLINE NUMBER: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-465-5161 for emergency assistance.

NOTE TO PHYSICIAN: This product is a pyrethroid. If large amounts have been ingested, the stomach and intestine should be evacuated. Treatment is symptomatic and supportive. Digestible fats, oils or alcohol may increase absorption and should be avoided.

PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS

Do not mix or allow product to come in contact with oxidizing agent. Hazardous chemical reaction may occur.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Keep out of reach of children and animals. Store in original bag only. Store in a clean, dry, well ventilated place and avoid excess heat. For bags after partial use, reseal opened bag by folding top down and securing.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling, if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

Questions & Comments
Call 1-800-225-2883 or visit ortho.com

©2020 The Ortho Group.
World rights reserved.
Sold by
The Ortho Group
P.O. Box 190
Marysville, OH 43040

EPA Reg. No. 239-2764
EPA Est. No. 538-OH-2V,
9198-OH-1M, 9198-OH-2V,
9198-AL-1L, 82757-FL-1L,
82757-OH-1K, 84175-TX-1B

Superscript is first letter of lot number.
1005
VID-PP
BG8262

FPO

0 71549 02033 0

LAWN INSECT KILLER

6 MONTH CONTROL*



✔ **Guaranteed Kill or Your Money Back****

⚡ **Kills by Contact**

🕒 **Fast-Acting†**

⬆️ **Kills Above & Below the Surface**

🏠 **Treats up to 16,500 SQ FT**

WHAT IT DOES:

⚡ **Kills 142 insects including ants, fleas, ticks, grubs, cutworms, chinch bugs, mole crickets, sod webworms, and spiders (see back panel for complete list)**

WHERE TO USE:

🌿 **Use on lawns, ornamentals, home perimeter, listed edibles (in vegetable gardens) and flower beds**

WHEN TO USE:

🕷️ **Apply at first sign of insect damage or activity**

*Ants (except pharaoh, carpenter and harvester ants) †Starts to kill in minutes, except against fire ants

ORTHO® Y SU ENTORNO

Su patio es un lugar para que su familia y sus mascotas lo disfruten. Es por eso que los productos Ortho® están diseñados cuidadosamente para proporcionar soluciones eficaces a los problemas de plagas en el exterior de su hogar. Para lograr los mejores resultados y proteger el medio ambiente, por favor siga las instrucciones para el correcto uso, almacenamiento y eliminación.

INSTRUCCIONES DE USO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con fines distintos de los indicados en la etiqueta.

RESTRICCIONES DE USO

- Aplique este producto directamente al área del césped o jardín. Riegue el área de tratamiento según se indica en esta etiqueta. No riegue hasta el punto que el agua escorra. No realice aplicaciones cuando este floviendo.
- No lo aplique a superficies impermeables, tales como aceras, entradas de automóvil y calles, donde sea probable que el agua arrastre el producto hasta alcantarillas y vías fluviales.
- No permita que las personas ni las mascotas ingresen de nuevo a las áreas tratadas sino hasta que los granulos hayan sido regados y el área está seca.
- En el estado de Nueva York, este producto NO debe aplicarse a ningún área de grama o césped (prados) que se encuentre a menos de 30.5 metros de distancia de un cuerpo de agua (lagos, estanques, ríos, arroyos, pantanos o cuencas de desague). En el estado de Nueva York, vuelva a realizar una sola nueva aplicación de este producto si hay indicios de actividad renovada de insectos, pero no antes de dos semanas después de la primera.
- Aplíquelo a principios de primavera para prevenir las infestaciones.
- Si no, aplíquelo en cuanto observe actividad o daños de insectos en el césped (cuando se tome ralo y de color marrón, o cuando salgan volando polillas al cortar). No trate únicamente el área del césped que se tome marrón. Para evitar mayores daños, trate el prado entero.

DATOS DEL PRODUCTO

INSECTOS QUE ELIMINA/CONTROLA POR 6 MESES

Use el Insecticida para céspedes Bug B-gon™ de Ortho® para eliminar y proporcionar un control residual de 6 meses contra:

- Hormigas la acrobata, la de montículo de allegheny, la argentina, la cabezona, la negra del césped, la citronela, la del maíz, la loca, la fantasma, la lasius spp, la negra pequeña, la olorosa, la del pavimento, la pirámide, la pequeña de la miel, la del azucar, la ladrona y la de las patas blancas

INSECTOS QUE ELIMINA/CONTROLA POR 3 MESES

Use el Insecticida para céspedes Bug B-gon™ de Ortho® para eliminar y proporcionar un control residual de 3 meses contra:

- Hormigas la roja recolectora
- Gusanos escupidores el de otoño y el del césped
- Escarabajos los picados (el del pasto azul y el cazador), el negro del césped del género Ateneus, el pulga del césped oreja de ratón, el de tierra, las maripuestas (la asiática, la convergente, la de siete puntos, la de tres puntos y la de dos puntaladas) y los gorgojos (el del pasto azul anual)
- Lepismas
- Orugas las cortadoras (la negra, la bronceada, la granulada y la pasapala), la del arbolito, el bicho cascador, el bicho cascador de la caña y los gusanos peludos (el del tepe y el tropical)
- Chinchas
- Grillos el de Arizona, el común de cola corta, el rallado del este, el de campo de otoño, el casero, el de cola corta de la India, el del bosque del norte, el de campo de arena, el de campo del sueste, el del bosque del sur, el de campo de primavera, el de campo de Texas, el tropical, el de campo variable, el de campo vocal y el rallado del oeste
- Tijeretas
- Insectos de fuego
- Moscas la larva de la tipula y la frit
- Saltamontes
- Áfidos del césped
- Saltarinas
- Chinchas de encaje
- Millipés
- Grillos topo el del sur y el leonado
- Polillas la de Lucerna
- Cochinitas
- Escorpiones el de cola rayada de Arizona, el común de California, el del este de arena, el del norte, el del sur y el de Baja California
- Gusanos de las semillas
- Cochinitas
- Arañas la labo escavadora, la grande de sótano, la mambrada de sótano, la lobo pirata, la pequeña de sótano y la de patas finas
- Gusanos escupidores el de dos líneas
- Garrapatas la americana del perro, la calé del perro y la del ciervo***
- ***Incluyendo las que pueden transmitir la enfermedad de Lyme
- Gusanos alambre

INSECTOS QUE ELIMINA/CONTROLA

El Insecticida para céspedes Bug B-gon™ de Ortho® también elimina:

- Escarabajos el asiático del jardín, la gallina ciega europea, el verde de junio, los erasmacardos, el de mayo/junio, el oriental y el de la caña de azúcar
- Orugas la del saco
- Cempis
- Pulgas la del gato
- Moscas la tipula (adulto) y la de la fruta
- Mosquitos del hongo los adultos y las larvas
- Gusanos blancos***
- Insectos jorobados ***en huertos de hortalizas
- Gusanos enrolladores de hojas
- Gusanos telarieros del césped
- Gorgojos el negro de la vid (larva) y el de la raíz (larva)
- Acaros
- Grillos topo el europeo, el del norte, la proletera y de alas cortas
- Chinchas de las plantas
- Cochinitas
- Insectos de arena gigante

Para controlar el gusano blanco del césped, aplique el Insecticida contra el gusano blanco para toda la temporada GrubEx® de Scotts® en cualquier momento entre principios de abril y agosto

DÓNDE APLICARLO	En céspedes	En jardines ornamentales y de flores
CUÁNDO APLICARLO	Alrededor de los cimientos de la casa (tratamiento perimetral)	En huertos de hortalizas
CÓMO APLICARLO	Aplicar al inicio de la primavera o el verano para prevenir la infestación. De lo contrario, aplique al primer indicio de actividad o daño de insectos.	Para obtener los mejores resultados, se debe regar completamente el área tratada después de la aplicación.
En céspedes	<ul style="list-style-type: none"> Usando un esparcidor diseñado para la aplicación de materiales granulados, aplique uniformemente 272 a 544 g sobre 93 m². Deje sin tratar una franja de césped de 30 cm a lo largo de superficies impermeables (tales como aceras y entradas de automóvil) y desagües para evitar posibles acumientos hacia alcantarillas y vías fluviales. Para un control durante toda la temporada, por 3 y 6 meses, aplique 1 kg de producto por cada 93 m²/272 g por cada 23 m². Con una bolsa de 4.5 kg se tratarán hasta 1,533 m² de césped. 	
En plantas ornamentales y flores	<ul style="list-style-type: none"> Aplique uniformemente de 136 a 272 g de producto sobre cada área de 46 m². Repita si hay señales de actividad renovada de insectos. El producto se puede aplicar justo antes de plantar o después de que broten las plantas. 	
En huertos de hortalizas	<ul style="list-style-type: none"> Se puede realizar una sola aplicación justo antes de sembrar o después de que las plantas broten y se evalúen con los primeros 10 a 15 cm de tierra. Utilice 272 g de producto para un área de 46 m². 	
En los cimientos de la casa	<ul style="list-style-type: none"> Aplique uniformemente una franja de 61 cm a lo largo de los cimientos de la casa. Use de 136 a 272 g de producto por cada 46 m² (0.61 x 76 m). Para un control de 3 y 6 meses, aplique 544 g de producto por cada 46 m²/272 g por cada 23 m². Si es necesario, vuelva a aplicar después de 3 meses. 	

PERSONAS Y MASCOTAS: No permita que las personas ni las mascotas ingresen de nuevo a las áreas tratadas sino hasta que los granulos hayan sido regados y el área está seca.

El Insecticida para céspedes Bug B-gon™ de Ortho® se puede aplicar a las verduras que se enumeran a continuación

CULTIVO	DÍAS DE ESPERA PARA COSECHAR
Tomates y maíz dulce	1
Avejas, arvejas dulces, tirabeques, ejotes (verdes y amarillos), frijoles verdes (judía verde, frijolillo), frijoles secos (frijol de ojo negro, guisante de la vaca), pepino, calabazas, melón, guiso, calabacín y sandía	3
Brócoli, brócoli chino, repollo, coliflor, colibrábano, mostaza china, berenjena, cabeza de lechuga y pimientos (morrión y de otros tipos)	7

CONSEJOS PARA USAR EL ESPARCIDOR Para obtener los mejores resultados, use un esparcidor Scotts®

ESPARCIDOR POSICIONES DEL ESPARCIDOR Gramos de producto/93 m² 272 g • 544 g • 1,043 g

Esparcidor por goteo Scotts® 6 • 8 • 9 3/4

Instrucciones: Corte el césped primero si la grama es tan alta que toca la parte inferior del esparcidor. Primero aplique dos franjas de marca. Opera el esparcidor en la dirección más larga del césped. Traslape las marcas de las ruedas para asegurar una cobertura uniforme. Apague el esparcidor cuando llegue a la franja de marca o cuando pare.

Esparcidor giratorio EdgeGuard® de Scotts® 2 1/4 • 3 1/4 • 4 1/2
Instrucciones: Apague el esparcidor cada vez que se detenga. Para una cobertura completa, haga cada pasada a aproximadamente 1.5 m de la marca de la rueda, de manera que haya cierto traslape. Para una aplicación uniforme, camine a un paso constante, trasladando ligeramente cada pasada.

Esparcidor Elite 3 3/4 • 4 1/4 • 4 3/4
Instrucciones: Dé una pasada por el perímetro con el EdgeGuard® encendido para proteger las áreas que no se van a tratar. Realice pasadas internas paralelas con una separación de 1.8 metros para asegurar una cobertura uniforme. Suelte el interruptor al dar la vuelta o al parar.

Cuando utilice otros esparcidores, calibre las posiciones del esparcidor de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Es nocivo si se ingiere. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien con agua y con jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o utilizar el modero.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios: El usuario debe lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el modero. El usuario debe quitarse la ropa o el equipo de protección individual (EPI) de inmediato si le cae dentro pesticida, para luego lavarse bien y ponerse ropa limpia.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Este producto es extremadamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discorra a desagües de tormenta, zanjas de drenaje, canales o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima templado, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas, ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no arrastren o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Barre el producto que caiga sobre la entrada de automóviles, la acera o la calle hacia el área tratada del césped para evitar que se derive a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere: • Llame a un centro de llamadas de control de emvenenamientos o a un médico inmediatamente para recibir instrucciones de tratamiento.
• Que la persona beba un vaso de agua si puede tragar.
• No induzca el vómito, a menos que así se lo indique el centro de control de emvenenamientos o el médico.
• No le de nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
• Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo con agua despaico y con cuidado por 15 a 20 minutos.

Si entra en los ojos: • Si tuviera lentes de contacto, quítelos después de lavarse con agua los primeros 5 minutos y continúe lavando el ojo.
• Llame a un centro de control de emvenenamientos o al médico para obtener recomendaciones de tratamiento.

Si entra en contacto con la piel o la ropa: • Quítese la ropa contaminada.
• Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos.
• Llame a un centro de control de emvenenamientos o al médico para obtener recomendaciones de tratamiento.

NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA: Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de control de emvenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento. También puede llamar al 1-877-465-5161 para recibir ayuda de emergencia.

AVISO PARA EL MÉDICO: Este producto es un piretroid. Si se ha ingerido en grandes cantidades, debe evacuar el estómago y el intestino. El tratamiento es para atender los síntomas y de apoyo. Las grasas, aceites o alcohol digestibles pueden aumentar la absorción y deben evitarse.

RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

No mezcle ni permita el contacto con agentes oxidantes. Podría producirse una reacción química peligrosa.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Manténgalo fuera del alcance de los niños y de los animales. Guárdelo en su bolsa original, únicamente. Almacénalo en un lugar limpio, seco y bien ventilado, y evite el calor excesivo. Después de usar parcialmente la bolsa, ciérrala de nuevo doblando la parte superior y asegurándola.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE: Este envase no se puede rellenas. No vuelva a utilizar ni a llenar este envase. Si está vacío: Colóquelo en la basura o recíclalo, si corresponde. Si está parcialmente lleno: Llame a su agente de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

ADVERTENCIA: En la medida contemplada por las leyes aplicables, el